



Enterobacter cloacae-Komplex

2024

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	**	**	**	**	2.550	34,4 ^g	32,6	36,3
	Piperacillin/Tazobactam	693	10,5 ^g	8,5	13,0	3.358	25,3	23,8	26,8
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	1.019	8,2 ^g	6,7	10,1
	Cefotaxim ^h	**	**	**	**	3.299	27,9	26,4	29,4
	Ceftazidim	487	10,3 ^g	7,9	13,3	3.299	27,2	25,7	28,7
	Ceftriaxon ^h	**	**	**	**	1.557	26,9 ^g	24,8	29,2
Carbapeneme	Ertapenem	**	**	**	**	1.379	13,5 ^g	11,8	15,4
	Imipenem	**	**	**	**	2.949	0,4 ^g	0,3	0,8
	Meropenem ^h	671	0,0 ^g	0,0	0,6	3.388	0,2	0,1	0,4
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	1.070	1,5	0,9	2,4	3.457	4,0	3,4	4,7
	Levofloxacin	857	1,5	0,9	2,6	2.437	3,6 ^g	2,9	4,4
	Moxifloxacin	**	**	**	**	544	7,9 ^g	5,9	10,5
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	**	**	**	**	2.591	2,1 ^g	1,6	2,7
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	610	1,0 ^g	0,5	2,1
Sonstige	Cotrimoxazol	1.069	3,6	2,7	4,9	3.478	6,4	5,6	7,2
	Trimethoprim ^h	613	6,0 ^g	4,4	8,2	342	8,2 ^g	5,7	11,6

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	1.894	33,7 ^g	31,6	35,8	553	37,4 ^g	33,5	41,5	196	35,7 ^g	29,3	42,6
	Piperacillin/Tazobactam	2.581	23,8	22,2	25,5	670	31,0	27,7	34,6	235	28,1	22,7	34,1
Cephalosporine	Cefepim	836	8,6 ^g	6,9	10,7	121	6,6	3,4	12,5	63	11,1	5,5	21,2
	Cefotaxim ^h	2.541	26,4	24,8	28,2	654	33,6	30,1	37,3	223	31,8 ^g	26,1	38,2
	Ceftazidim	2.539	25,7	24,0	27,4	658	33,3	29,8	37,0	223	32,7 ^g	26,9	39,1
	Ceftriaxon ^h	1.204	25,2 ^g	22,8	27,7	274	35,8	30,3	41,6	104	27,9 ^g	20,2	37,2
Carbapeneme	Ertapenem	1.062	11,9 ^g	10,1	13,9	251	19,5	15,1	24,9	87	11,5 ^g	6,4	19,9
	Imipenem	2.210	0,5 ^g	0,3	0,9	625	0,2	0,0	0,9	249	0,4	0,1	2,2
	Meropenem ^h	2.598	0,2	0,1	0,5	669	0,1	0,0	0,8	249	0,0	0,0	1,5
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	2.661	3,8	3,1	4,6	675	5,0	3,6	7,0	248	4,4	2,5	7,8
	Levofloxacin	1.933	3,5 ^g	2,8	4,4	373	4,3	2,7	6,9	157	1,9	0,7	5,5
	Moxifloxacin	445	8,1 ^g	5,9	11,0	67	7,5 ^g	3,2	16,3	50	8,0 ^g	3,2	18,8
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	1.974	2,1 ^g	1,6	2,9	559	1,8 ^g	1,0	3,3	204	2,0	0,8	4,9
	Tobramycin ^h	465	0,9 ^g	0,3	2,2	103	1,0 ^g	0,2	5,3	60	3,3	0,9	11,4
Sonstige	Cotrimoxazol	2.678	6,8	5,9	7,8	679	5,3	3,9	7,3	249	4,0	2,2	7,2
	Trimethoprim ^h	306	7,8 ^g	5,3	11,4	**	**	**	**	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Urin stationär				Wunde ambulant				Wunde stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	656	46,0 ^g	42,3	49,9	**	**	**	**	748	29,3	26,1	32,6
	Piperacillin/Tazobactam	1.177	29,8	27,3	32,5	145	6,2 ^g	3,3	11,4	813	23,4	20,6	26,4
Cephalosporine	Cefepim	493	11,6	9,0	14,7	**	**	**	**	238	5,5	3,2	9,1
	Cefotaxim ^h	1.152	33,3	30,7	36,1	**	**	**	**	805	24,2	21,4	27,3
	Ceftazidim	1.140	32,2	29,5	35,0	135	8,1	4,6	14,0	810	24,1	21,3	27,1
	Ceftriaxon ^h	575	32,0	28,3	35,9	**	**	**	**	356	22,2	18,2	26,8
Carbapeneme	Ertapenem	491	15,5 ^g	12,5	18,9	**	**	**	**	417	12,9 ^g	10,1	16,5
	Imipenem	705	0,3 ^g	0,1	1,0	**	**	**	**	826	0,4	0,1	1,1
	Meropenem ^h	1.136	0,1	0,0	0,5	135	0,0	0,0	2,8	838	0,0	0,0	0,5
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	1.221	6,1	4,9	7,5	179	1,1	0,3	4,0	831	3,2	2,2	4,7
	Levofloxacin	1.005	5,2	4,0	6,7	113	1,8	0,5	6,2	639	2,5	1,5	4,0
	Moxifloxacin	151	11,9	7,7	18,1	**	**	**	**	147	6,1	3,3	11,2
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	762	3,7	2,6	5,3	**	**	**	**	612	1,1	0,6	2,3
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	**	**	**	**	203	0,0	0,0	1,9
Sonstige	Cotrimoxazol	1.229	9,2	7,7	10,9	179	3,4	1,5	7,1	837	4,4	3,2	6,0
	Trimethoprim ^h	365	7,4	5,1	10,5	**	**	**	**	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.

Von Urinen aus dem ambulanten Bereich liegen zu wenige Isolate vor.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	540	28,0 ^g	24,3	31,9	1.912	35,5 ^g	33,3	37,6
	Piperacillin/Tazobactam	780	20,6	17,9	23,6	2.397	25,9	24,2	27,7
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	767	7,7 ^g	6,0	9,8
	Cefotaxim ^h	754	23,2	20,3	26,4	2.390	28,5	26,7	30,3
	Ceftazidim	772	22,8	20,0	25,9	2.376	27,7	26,0	29,6
	Ceftriaxon ^h	512	21,5 ^g	18,1	25,2	887	28,1	25,2	31,1
Carbapeneme	Ertapenem	255	10,6 ^g	7,4	15,0	1.097	14,2	12,3	16,4
	Imipenem	645	0,9 ^g	0,4	2,0	2.163	0,3 ^g	0,2	0,7
	Meropenem ^h	724	0,6	0,2	1,4	2.494	0,1	0,0	0,4
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	780	4,1	2,9	5,7	2.493	3,8	3,1	4,6
	Levofloxacin	654	4,4	3,1	6,3	1.645	3,0 ^g	2,3	3,9
	Moxifloxacin	**	**	**	**	458	9,0 ^g	6,7	11,9
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	407	2,2 ^g	1,2	4,1	2.063	2,0	1,5	2,7
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	561	1,1 ^g	0,5	2,3
Sonstige	Cotrimoxazol	785	5,7	4,3	7,6	2.508	6,4	5,5	7,4
	Trimethoprim ^h	99	12,1 ^g	7,1	20,0	205	6,8 ^g	4,1	11,1

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.

Enterobacter cloacae-Komplex

2023

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	**	**	**	**	3.028	35,5 ^g	33,8	37,2
	Piperacillin/Tazobactam	638	11,9 ^g	9,6	14,7	4.029	26,5	25,2	27,9
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	1.097	8,8 ^g	7,2	10,6
	Cefotaxim ^h	**	**	**	**	3.983	29,0	27,7	30,5
	Ceftazidim	405	12,3 ^g	9,5	15,9	4.004	28,6	27,2	30,0
	Ceftriaxon ^h	**	**	**	**	1.842	26,1 ^g	24,2	28,2
Carbapeneme	Ertapenem	**	**	**	**	1.439	12,1	10,5	13,9
	Imipenem	198	0,0 ^g	0,0	1,9	3.322	0,2 ^g	0,1	0,4
	Meropenem ^h	602	0,0 ^g	0,0	0,6	3.963	0,1	0,0	0,3
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	1.106	2,2	1,5	3,2	4.020	4,7	4,1	5,4
	Levofloxacin	880	2,3	1,5	3,5	2.952	4,2 ^g	3,6	5,0
	Moxifloxacin	**	**	**	**	765	7,6 ^g	5,9	9,7
Aminoglykoside	Amikacin ^h	**	**	**	**	742	0,0	0,0	0,5
	Gentamicin ^h	203	0,0 ^g	0,0	1,9	3.054	2,1 ^g	1,6	2,6
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	1.344	2,4 ^g	1,7	3,3
Sonstige	Cotrimoxazol	1.109	3,3	2,4	4,6	4.042	5,7	5,0	6,5
	Trimethoprim ^h	680	6,0 ^g	4,5	8,1	519	7,5 ^g	5,5	10,1

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	2.247	33,0 ^g	31,1	34,9	669	43,6 ^g	39,9	47,4	219	37,4	31,3	44,0
	Piperacillin/Tazobactam	3.116	24,3	22,9	25,9	796	35,1	31,8	38,4	261	30,7	25,4	36,5
Cephalosporine	Cefepim	919	9,1 ^g	7,4	11,2	128	4,7 ^g	2,2	9,8	47	*	*	*
	Cefotaxim ^h	3.076	26,8	25,2	28,3	790	37,8	34,5	41,3	255	34,5	28,9	40,5
	Ceftazidim	3.089	26,3	24,8	27,9	794	37,8	34,5	41,2	256	34,8	29,2	40,8
	Ceftriaxon ^h	1.398	24,9 ^g	22,7	27,2	349	31,2	26,6	36,3	113	30,1	22,4	39,1
Carbapeneme	Ertapenem	1.156	10,1	8,5	12,0	241	19,9	15,4	25,4	71	11,3 ^g	5,8	20,7
	Imipenem	2.454	0,1 ^g	0,0	0,3	748	0,5	0,2	1,4	259	0,8	0,2	2,8
	Meropenem ^h	3.052	0,1	0,0	0,2	793	0,3	0,1	0,9	262	0,8	0,2	2,7
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	3.109	4,4	3,7	5,2	795	5,8	4,4	7,6	261	3,8	2,1	6,9
	Levofloxacin	2.337	4,1 ^g	3,4	5,0	498	4,8	3,3	7,1	156	1,3 ^g	0,4	4,6
	Moxifloxacin	571	7,2 ^g	5,3	9,6	145	8,3 ^g	4,8	13,9	61	6,6 ^g	2,6	15,7
Aminoglykoside	Amikacin ^h	531	0,0	0,0	0,7	155	0,0	0,0	2,4	56	0,0	0,0	6,4
	Gentamicin ^h	2.316	2,1 ^g	1,6	2,7	661	2,1 ^g	1,3	3,5	224	2,7	1,2	5,7
	Tobramycin ^h	1.009	2,5 ^g	1,7	3,6	277	2,5	1,2	5,1	107	4,7	2,0	10,5
Sonstige	Cotrimoxazol	3.126	5,7	4,9	6,5	799	6,0	4,6	7,9	261	4,2	2,4	7,4
	Trimethoprim ^h	477	7,1 ^g	5,1	9,8	**	**	**	**	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.

Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Urin stationär				Wunde ambulant				Wunde stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	860	46,3 ^g	43,0	49,6	**	**	**	**	840	30,8	27,8	34,0
	Piperacillin/Tazobactam	1.492	32,1	29,8	34,5	109	9,2 ^g	5,1	16,1	968	23,6	21,0	26,3
Cephalosporine	Cefepim	577	14,2	11,6	17,3	**	**	**	**	258	2,7	1,3	5,5
	Cefotaxim ^h	1.476	34,8	32,4	37,3	**	**	**	**	960	25,0	22,4	27,8
	Ceftazidim	1.471	34,2	31,8	36,7	**	**	**	**	970	25,1	22,4	27,9
	Ceftriaxon ^h	686	32,5	29,1	36,1	**	**	**	**	428	23,8	20,0	28,1
Carbapeneme	Ertapenem	545	16,1	13,3	19,5	**	**	**	**	409	7,6	5,4	10,6
	Imipenem	747	0,1	0,0	0,8	**	**	**	**	963	0,1	0,0	0,6
	Meropenem ^h	1.415	0,1	0,0	0,4	**	**	**	**	970	0,1	0,0	0,6
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	1.493	6,1	5,0	7,4	163	1,2	0,3	4,4	965	3,5	2,5	4,9
	Levofloxacin	1.269	5,0	4,0	6,4	111	0,0	0,0	3,3	752	3,2	2,2	4,7
	Moxifloxacin	229	10,5 ^g	7,1	15,1	**	**	**	**	217	6,9 ^g	4,2	11,1
Aminoglykoside	Amikacin ^h	288	0,0	0,0	1,3	**	**	**	**	213	0,0	0,0	1,8
	Gentamicin ^h	935	3,0	2,1	4,3	82	0,0 ^g	0,0	4,5	737	1,5	0,8	2,7
	Tobramycin ^h	433	4,4	2,8	6,8	**	**	**	**	280	1,8	0,8	4,1
Sonstige	Cotrimoxazol	1.498	8,1	6,9	9,6	167	1,8	0,6	5,1	969	4,6	3,5	6,2
	Trimethoprim ^h	535	7,5	5,5	10,0	**	**	**	**	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.

Von Urinen aus dem ambulanten Bereich liegen zu wenige Isolate vor.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	635	33,2	29,7	37,0	2.307	35,8 ^g	33,8	37,7
	Piperacillin/Tazobactam	869	23,2	20,6	26,2	2.994	27,0	25,5	28,6
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	805	9,4 ^g	7,6	11,7
	Cefotaxim ^h	847	27,5	24,6	30,6	2.992	29,0	27,4	30,6
	Ceftazidim	870	27,1	24,3	30,2	2.990	28,7	27,1	30,3
	Ceftriaxon ^h	563	26,1 ^g	22,7	29,9	1.145	24,7	22,3	27,3
Carbapeneme	Ertapenem	199	6,5 ^g	3,9	10,9	1.240	13,0	11,2	15,0
	Imipenem	743	0,0 ^g	0,0	0,5	2.447	0,2 ^g	0,1	0,5
	Meropenem ^h	814	0,0	0,0	0,5	2.998	0,1	0,1	0,3
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	873	5,4	4,1	7,1	2.982	4,3	3,7	5,1
	Levofloxacin	770	4,3 ^g	3,1	6,0	2.041	4,0 ^g	3,2	4,9
	Moxifloxacin	247	5,3 ^g	3,1	8,8	472	8,1 ^g	5,9	10,9
Aminoglykoside	Amikacin ^h	**	**	**	**	742	0,0	0,0	0,5
	Gentamicin ^h	442	2,7 ^g	1,6	4,7	2.513	1,9 ^g	1,5	2,6
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	1.252	2,4	1,7	3,4
Sonstige	Cotrimoxazol	875	5,4	4,1	7,1	3.001	5,6	4,8	6,4
	Trimethoprim ^h	114	10,5 ^g	6,1	17,5	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

g - Bei dieser Substanz sind für weniger als 90% aller Isolate die Ergebnisse einer Resistenztestung im Datensatz vorliegend. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen.



Enterobacter cloacae

2022

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	21	*	*	*	2.373	30,0	28,2	31,9
	Piperacillin/Tazobactam	481	10,8	8,3	13,9	3.647	23,0	21,7	24,4
Cephalosporine	Cefepim	48	*	*	*	1.076	10,6	8,9	12,6
	Cefotaxim	378	10,6	7,9	14,1	3.609	24,7	23,3	26,1
	Ceftazidim	309	10,4	7,4	14,3	3.334	23,9	22,5	25,4
	Ceftazidim/Avibactam	**	**	**	**	268	0,7	0,2	2,7
	Ceftriaxon	71	15,5	8,9	25,7	1.360	19,0	17,0	21,1
Carbapeneme	Ertapenem	29	*	*	*	1.256	10,1	8,6	11,9
	Imipenem	252	0,0	0,0	1,5	2.947	0,2	0,1	0,5
	Meropenem	401	0,0	0,0	0,9	3.554	0,2	0,1	0,4
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	790	1,3	0,7	2,3	3.652	4,2	3,6	4,9
	Levofloxacin	588	1,4	0,7	2,7	2.556	3,9	3,2	4,7
	Moxifloxacin	152	4,6	2,2	9,2	1.573	8,6	7,4	10,1
Aminoglykoside	Amikacin	**	**	**	**	512	0,4	0,1	1,4
	Gentamicin	354	0,6	0,2	2,0	2.760	1,8	1,4	2,4
	Tobramycin	24	*	*	*	1.143	3,8	2,8	5,0
Sonstige	Cotrimoxazol	789	2,7	1,7	4,0	3.666	4,7	4,1	5,5
	Trimethoprim	425	6,8	4,8	9,6	605	5,5	3,9	7,6

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	1.689	27,6	25,5	29,8	478	40,6	36,3	45,0	160	38,1	31,0	45,8
	Piperacillin/Tazobactam	2.728	21,1	19,6	22,6	645	33,5	30,0	37,2	206	23,3	18,0	29,5
Cephalosporine	Cefepim	915	10,8	9,0	13,0	115	9,6	5,4	16,3	40	*	*	*
	Cefotaxim	2.696	22,6	21,1	24,2	638	34,8	31,2	38,6	205	28,8	23,0	35,3
	Ceftazidim	2.457	21,8	20,2	23,5	613	33,4	29,8	37,3	204	27,0	21,3	33,4
	Ceftazidim/Avibactam	165	1,2	0,3	4,3	59	0,0	0,0	6,1	21	*	*	*
	Ceftriaxon	1.039	19,7	17,4	22,3	209	19,1	14,4	25,0	94	16,0	9,9	24,7
Carbapeneme	Ertapenem	993	8,6	7,0	10,5	184	17,4	12,6	23,5	70	8,6	4,0	17,5
	Imipenem	2.143	0,1	0,0	0,4	586	0,7	0,3	1,7	206	0,5	0,1	2,7
	Meropenem	2.665	0,1	0,0	0,3	640	0,5	0,2	1,4	207	0,5	0,1	2,7
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	2.732	4,5	3,8	5,3	645	3,6	2,4	5,3	207	5,8	3,3	9,9
	Levofloxacin	1.944	4,1	3,3	5,0	367	4,1	2,5	6,6	142	2,8	1,1	7,0
	Moxifloxacin	1.087	8,8	7,3	10,7	337	9,5	6,8	13,1	111	14,4	9,1	22,1
Aminoglykoside	Amikacin	356	0,6	0,2	2,0	103	0,0	0,0	3,6	40	*	*	*
	Gentamicin	2.048	1,9	1,4	2,6	554	2,0	1,1	3,5	179	3,9	1,9	7,9
	Tobramycin	828	3,9	2,8	5,4	250	3,6	1,9	6,7	89	6,7	3,1	13,9
Sonstige	Cotrimoxazol	2.741	5,1	4,3	6,0	646	3,6	2,4	5,3	207	7,2	4,4	11,6
	Trimethoprim	499	5,6	3,9	8,0	46	*	*	*	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Piperacillin	686	31,5	28,1	35,1	1.605	28,6	26,4	30,9
	Piperacillin/Tazobactam	962	22,0	19,5	24,8	2.497	22,6	21,0	24,3
Cephalosporine	Cefepim	368	7,3	5,1	10,5	637	12,6	10,2	15,4
	Cefotaxim	927	23,7	21,1	26,6	2.494	23,9	22,3	25,7
	Ceftazidim	796	23,6	20,8	26,7	2.419	23,2	21,5	24,9
	Ceftazidim/Avibactam	1	*	*	*	267	0,7	0,2	2,7
	Ceftriaxon	521	16,5	13,6	19,9	712	18,3	15,6	21,3
Carbapeneme	Ertapenem	359	10,9	8,0	14,5	893	9,9	8,1	12,0
	Imipenem	823	0,2	0,1	0,9	1.974	0,3	0,1	0,6
	Meropenem	892	0,2	0,1	0,8	2.494	0,2	0,1	0,4
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	969	3,2	2,3	4,5	2.491	4,3	3,5	5,1
	Levofloxacin	896	2,3	1,5	3,6	1.496	4,2	3,3	5,4
	Moxifloxacin	562	6,0	4,4	8,3	954	9,7	8,0	11,8
Aminoglykoside	Amikacin	104	0,0	0,0	3,6	408	0,5	0,1	1,8
	Gentamicin	553	1,8	1,0	3,3	2.074	1,8	1,3	2,4
	Tobramycin	142	3,5	1,5	8,0	988	3,6	2,6	5,0
Sonstige	Cotrimoxazol	971	4,0	3,0	5,4	2.503	4,8	4,0	5,7
	Trimethoprim	119	6,7	3,4	12,7	445	5,4	3,7	7,9

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall